

Dérivation des fonctions numériques

Je me souviens	2
Dérivée	2
Théorème de Rolle	2
Accroissements finis	2
Opérations sur les fonctions dérivables	2
Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$	3
Limite de la dérivée	3
 Annexe	3
Complément : le théorème de Darboux	3
 Exercices	4
Exercices et résultats classiques à connaître	4
Si P est scindé simple sur $\mathbb{R}$, P' aussi	4
Un prolongement $\mathcal{C}^1$	4
Exercices du CCINP	5
Exercices	5
Petits problèmes d'entraînement	5

Je me souviens

Dérivée

1. Comment définir la dérivée en a de $f : I \rightarrow \mathbb{K}$.
2. Équation de la tangente ?
3. Une ~~autre définition~~ caractérisation de la dérivée ?
4. Dérivée à droite ? à gauche ?
5. Lien entre dérivabilité et continuité ?
6. Dérivée des fonctions $I \rightarrow \mathbb{C}$?
7. Quelle est la dérivée de $e^{(1+i)t}$?

Théorème de Rolle

On ne parle ici que de fonctions réelles.

8. Pour $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, définir « f admet un maximum global en a ».
9. Pour $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, définir « f admet un maximum local en a ».
10. Énoncer le théorème faisant le lien entre extremum local et annulation de la dérivée.
11. Énoncer le théorème de Rolle.

Accroissements finis

12. Quelle est l'égalité des accroissements finis ?
13. Quelle est l'inégalité des accroissements finis ?
14. Il y a un lien avec le théorème fondamental de l'analyse ?
15. À quelle condition f dérivable est-elle constante ?
16. À quelle condition f dérivable à valeurs réelles est-elle croissante ?
17. À quelle condition f dérivable à valeurs réelles est-elle strictement croissante ?

Opérations sur les fonctions dérivables

18. $(\lambda f + \mu g)'(x) =$
19. $(f \times g)'(x) =$
20. $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) =$
21. $(g \circ f)'(x) =$
22. $(f^{-1})'(x) =$

Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

23. Définir « f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I »
24. Définir « f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I », où $k \in \mathbb{K}$.
25. Définir « f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I »
26. $(\lambda f + \mu g)^{(k)}(x) =$
27. Énoncer la formule de Leibniz.
28. Comment démontrer la formule de Leibniz ?
29. Pour $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^k$ et $\phi : J \rightarrow I$ de classe $\mathcal{C}^k$, que dire de $f \circ \phi$?

Limite de la dérivée

30. Énoncer le théorème limite de la dérivée.
31. Comment utiliser le résultat précédent pour prolonger à I de façon $\mathcal{C}^1$ une fonction définie sur $I \setminus \{a\}$?

Annexe

Complément : le théorème de Darboux

Théorème de Darboux.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable. Alors f' satisfait la propriété des valeurs intermédiaires.

Remarque. Ce théorème est complètement hors programme. Il est intéressant lorsque f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$, c'est-à-dire lorsque l'on ne peut pas appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à f' .

Preuve.

- On suppose f dérivable sur $[a, b]$, et on considère γ entre $f'(a)$ et $f'(b)$. On cherche $c \in [a, b]$ tel que $f'(c) = \gamma$.
L'idée est celle du théorème de Rolle, pour lequel la

conclusion est analogue, mais avec $\gamma = 0$. On considère donc :

$$g : x \mapsto f(x) - \gamma x$$

g est continue sur le segment $[a, b]$, donc admet un minimum et un maximum, par le théorème des bornes atteintes.

- Si le minimum ou le maximum est atteint en $c \in]a, b[$, on a trouvé c tel que $g'(c) = 0$, c'est-à-dire $f'(c) = \gamma$.
- Sinon, le minimum et le maximum sont par exemple atteints en a et b respectivement, et donc $g'(a) \geq 0$ et $g'(b) \leq 0$. Par hypothèse, $g'(a) = f'(a) - \gamma$ et $g'(b) = f'(b) - \gamma$ sont de signes opposés, donc les deux inégalités ne peuvent être strictes. On a trouvé c (égal à a ou b) tel que $g'(c) = 0$, c'est-à-dire $f'(c) = \gamma$.

□

Exercices et résultats classiques à connaître**Si P est scindé simple sur $\mathbb{R}$, P' aussi****630.1**

- (a) Montrer que, si $P \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme de degré ≥ 2 , scindé à racines simples, alors P' est aussi scindé à racines simples.
- (b) Le résultat est-il vrai si on suppose $P \in \mathbb{C}[X]$?
- (c) [*] Montrer que, si $P \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme scindé, alors P' est aussi scindé.

Un prolongement $\mathcal{C}^1$ **630.2**

Montrer que la fonction, définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f : x \mapsto x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

se prolonge à $\mathbb{R}$ en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercices du CCINP

630.3


1. On pose $g(x) = e^{2x}$ et $h(x) = \frac{1}{1+x}$.

Calculer, pour tout entier naturel k , la dérivée d'ordre k des fonctions g et h sur leurs ensembles de définitions respectifs.

2. On pose $f(x) = \frac{e^{2x}}{1+x}$.

En utilisant la formule de Leibniz concernant la dérivée $n^{\text{ième}}$ d'un produit de fonctions, déterminer, pour tout entier naturel n et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, la valeur de $f^{(n)}(x)$.

3. Démontrer, dans le cas général, la formule de Leibniz, utilisée dans la question précédente.

630.4


1. Énoncer le théorème des accroissements finis.

2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in]a, b[$.

On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et que f est dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$.

Démontrer que, si f' admet une limite finie en x_0 , alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.

3. Prouver que l'implication : (f est dérivable en x_0) $\implies$ (f' admet une limite finie en x_0) est fausse.

Indication : on pourra considérer la fonction g définie par : $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 0$.

Exercices

630.5

Montrer que le polynôme :

$$((X^2 - 1)^n)^{(n)}$$

est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

630.6

Utiliser les accroissements finis pour démontrer les inégalités :

- (a) $|\sin x| \leq |x|$ pour $x \in \mathbb{R}$
 (b) $\ln(1+x) \leq x$ pour $x \in \mathbb{R}_+$.

630.7

Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{d^n}{dx^n}(\cos x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) \text{ et } \frac{d^n}{dx^n}(\sin x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$$

630.8

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n -ème de :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| (a) x^k | (d) $\cos^3 x$ |
| (b) $\frac{1}{x}$ | (e) $\cos(x)e^x$ |
| (c) $(x^2 - x + 1)e^{-x}$ | (f) $\frac{1}{x^2 - 1}$ |

Petits problèmes d'entraînement

630.9

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. On suppose que f admet des limites finies et égales en $+\infty$ et en $-\infty$. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

630.10

- (a) On définit sur $\mathbb{R}$:

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

(b) En déduire que la fonction définie par :

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{\frac{2}{x^2-1}} & \text{si } x \in]-1, 1[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est aussi de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

630.11

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{d^n}{dx^n} \operatorname{Arctan}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n}$$

où P_n est un polynôme, scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

630.12

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et dérivable. On suppose que la dérivée f' admet une limite ℓ en $+\infty$. Déterminer ℓ .

630.13

On considère :

$$f : x \mapsto \operatorname{Arctan}(x) + \sin(x)$$

- (a) Montrer que f n'a pas de limite en $+\infty$.
- (b) Montrer que f est majorée, et déterminer sa borne supérieure.
- (c) Montrer que la dérivée de f s'annule une infinité de fois sur $\mathbb{R}$.
- (d) Montrer que f n'admet pas de maximum global sur $\mathbb{R}$.

630.14

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ admettant une limite finie en $+\infty$ et en $-\infty$. Montrer que f'' s'annule.