

# Dénombrément

<b>Cours</b>	<b>2</b>
1 Ensembles finis . . . . .	2
1.1 Définition . . . . .	2
1.2 Propriétés . . . . .	2
1.3 Exemples de cardinaux . . . . .	2
2 Dénombrément d'applications, de parties d'un ensemble . . . . .	3
2.1 Nombre d'applications . . . . .	3
2.2 Nombre de parties d'un ensemble . . . . .	3
2.3 Fonction indicatrice . . . . .	3
3 Listes, nombre d' injections . . . . .	3
4 Combinaisons . . . . .	4
<b>Exercices</b>	<b>4</b>
Exercices et résultats classiques à connaître . . . . .	4
Nombre de parties . . . . .	4
Exercices du CCINP . . . . .	5
Exercices . . . . .	5
Petits problèmes d' entraînement . . . . .	5

## 1 Ensembles finis

### 1.1 Définition

**Définition.** On dit qu'un ensemble  $E$  est **fini** lorsqu'il est vide, ou qu'il existe  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $E$  soit en bijection avec  $\{1, \dots, n\}$ .

Dans le premier cas, on définit  $\text{Card}(E) = 0$ . Dans le second cas,  $n$  est unique et on définit  $\text{Card}(E) = n$ .

### 1.2 Propriétés

**Proposition.** Deux ensembles finis ont le même cardinal si et seulement s'il existe une bijection entre ces ensembles.

**Remarque.** En général, on n'exhibe pas explicitement cette bijection. Mais on décrit les deux ensembles en bijection par une formulation telle que :

« Définir [tel élément de  $A$ ], c'est définir [tel élément de  $B$ ] et [tel élément de  $C$ ] » qui signifie que  $A$  et  $B \times C$  sont de même cardinaux.

**Proposition.** Soit  $E$  un ensemble fini, et  $A \subset E$ . Alors :

- $A$  est fini et  $\text{Card}(A) \leq \text{Card}(E)$
- $A = E \iff \text{Card } A = \text{Card } E$ .

**Proposition.** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis de même cardinal, et  $\varphi : E \rightarrow F$ . Alors :

$$\varphi \text{ bijective} \iff \varphi \text{ injective} \iff \varphi \text{ surjective}$$

### 1.3 Exemples de cardinaux

**Proposition.** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis. Alors  $E \times F$  est fini et :

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \text{ Card}(F)$$

**Corollaire.** Si  $E_1, E_2, \dots, E_p$  sont des ensembles finis, alors  $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$  est fini et :

$$\text{Card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = \text{Card}(E_1) \text{ Card}(E_2) \dots \text{Card}(E_p)$$

**Proposition.** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis. Alors  $E \cup F$  est fini et :

- si l'union est disjointe,  $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F)$  ;
- en général,  $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F) - \text{Card}(E \cap F)$ .

**Corollaire.** Si  $E_1, E_2, \dots, E_p$  sont des ensembles finis deux à deux disjoints, alors  $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_p$  est fini et :

$$\text{Card} \left( \bigcup_{i=1}^p E_i \right) = \sum_{i=1}^p \text{Card}(E_i)$$

## 2 Dénombrément d'applications, de parties d'un ensemble

### 2.1 Nombre d'applications

**Théorème.**

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis de cardinaux respectifs  $p$  et  $n$ . On note  $\mathcal{F}(E, F) = F^E$  l'ensemble des applications :  $E \rightarrow F$ .

Alors  $F^E$  est fini et :

$$\text{Card}(F^E) = p^n = \text{Card}(F)^{\text{Card } E}$$

### 2.2 Nombre de parties d'un ensemble

**Théorème.**

Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n$ . Alors l'ensemble de ses parties,  $\mathcal{P}(E)$ , est fini, et :

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n = 2^{\text{Card}(E)}$$

### 2.3 Fonction indicatrice

**Définition.** Soit  $E$  un ensemble et  $A$  une partie de  $E$ . On appelle **fonction indicatrice de  $A$**  (ou parfois fonction caractéristique de  $A$ ) l'application :

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\rightarrow \{0, 1\} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

**Proposition.** L'application :  $\begin{array}{rcl} \mathcal{P}(E) & \rightarrow & \{0, 1\}^E \\ A & \mapsto & \mathbb{1}_A \end{array}$  est une bijection.

## 3 Listes, nombre d'injections

**Définition.** Soit  $E$  un ensemble. On appelle  **$p$ -liste d'éléments distincts de  $E$**  tout  $p$ -uplet  $(x_1, \dots, x_p)$  d'éléments de  $E$  deux à deux distincts.

**Proposition.** Si  $\text{Card}(E) = n$  et  $p \leq n$ , le nombre de  $p$ -listes d'éléments distincts de  $E$  est :

$$n(n-1)\dots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

**Proposition.** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis, de cardinaux respectifs  $p$  et  $n$ . Le nombre d'applications injectives  $E \rightarrow F$  est :

$$n(n-1)\dots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

**Corollaire.** Si  $E$  est un ensemble fini de cardinal  $n$ , alors :

$$\text{Card}(\mathfrak{S}(E)) = n!$$

où  $\mathfrak{S}(E)$  désigne l'ensemble des permutations de  $E$ , c'est-à-dire les bijections :  $E \rightarrow E$ .

## 4 Combinaisons

**Définition.** Soit  $E$  un ensemble. On appelle  $p$ -**combinaison** une partie de  $E$  à  $p$  éléments.

**Définition.** Pour  $n, p \in \mathbb{N}$ , on appelle  $p$  **parmi**  $n$  et on note  $\binom{n}{p}$  le nombre de  $p$ -combinaisons d'un ensemble à  $n$  éléments, c'est-à-dire le nombre de parties à  $p$  éléments.

**Proposition.** Lorsque  $0 \leq p \leq n$ ,  $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

**Remarque.** Il est maladroit de systématiquement remplacer un coefficient binomial par son expression factorielle.

**Proposition.**

- $\binom{n}{0} = 1$
- $\binom{n}{n} = 1$
- Pour  $p > n$  ou  $p < 0$ ,  $\binom{n}{p} = 0$
- $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$
- $\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1}$  (*formule de Pascal*)
- $\binom{n}{p} = \frac{n}{p} \binom{n-1}{p-1}$  pour  $n, p \geq 1$
- $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n$

## Exercices et résultats classiques à connaître

### Nombre de parties

#### 810.1

(a) Justifier que  $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n$ .

(b) Justifier que  $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p}^2 = \binom{2n}{n}$  en commençant par remarquer que  $\binom{n}{p}^2 = \binom{n}{p} \binom{n}{n-p}$ .

## Exercices du CCINP

**810.2**

 112

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $E$  un ensemble possédant  $n$  éléments.  
On désigne par  $\mathcal{P}(E)$  l'ensemble des parties de  $E$ .

1. Déterminer le nombre  $a$  de couples  $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$  tels que  $A \subset B$ .
2. Déterminer le nombre  $b$  de couples  $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$  tels que  $A \cap B = \emptyset$ .
3. Déterminer le nombre  $c$  de triplets  $(A, B, C) \in (\mathcal{P}(E))^3$  tels que  $A, B$  et  $C$  soient deux à deux disjoints et vérifient  $A \cup B \cup C = E$ .

## Exercices

**810.3**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $k \in \{1, \dots, n\}$ . Montrer que :  $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ .

**810.4**

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , calculer  $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$ .

**810.5**

On appelle **main** d'un joueur cinq cartes issues d'un jeu de 32 cartes.

- (a) Combien y a-t-il de mains différentes ?
- (b) Combien comportent exactement un as ?
- (c) Combien comportent au moins un as ?
- (d) Combien comportent exactement un as et un cœur ?
- (e) Combien comportent au moins un as ou un cœur ?
- (f) Combien comportent au moins un as et au moins un cœur ?

## Petits problèmes d'entraînement

**810.6**

Pour  $E$  ensemble, on appelle **recouvrement** de  $E$  tout couple  $(A, B)$  tel que  $A \cup B = E$ . On note  $R_n$  le nombre de recouvrements d'un ensemble à  $n$  éléments.

- (a) Que valent  $R_0$  et  $R_1$  ?
- (b) Soit  $E$  un ensemble de cardinal  $n$ .
  - b1. Pour  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$  et  $A$  une partie de  $E$  à  $k$  éléments, combien y a-t-il de parties  $B$  telles que  $A \cup B = E$  ?
  - b2. En déduire  $R_n$  sous la forme d'une somme, puis simplifier cette somme.

**810.7**

Soit  $p, q \in \mathbb{N}$  et  $n \in \{0, \dots, p+q\}$ .

- (a) Montrer que  $\binom{p+q}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$ .
- (b) En déduire que  $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ .

**810.8**

Lorsque l'on énumère, en binaire, tous les entiers de 1 à 1024, combien de fois utilise-t-on le chiffre 1 ?

**810.9**

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $E$  un ensemble de cardinal  $n$ .

- (a) Combien y a-t-il de lois de composition interne sur  $E$  ?
- (b) Combien y a-t-il de lois de composition interne sur  $E$  admettant un élément neutre ?